

NAPROXENO

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El naproxeno está indicado para el tratamiento de los procesos inflamatorios y dolorosos de las articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, como la artritis reumatoide, artrosis y espondilitis anquilosante. También se lo usa para el tratamiento de los ataques agudos de gota, síndromes reumatoides y para los dolores menstruales.

Se presenta en forma de: -cápsulas y comprimidos
-comprimidos con cubierta entérica
-geles



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al naproxeno.
- ✓ No utilice este medicamento con otros productos que ya contengan naproxeno.
- ✓ No utilice este medicamento si está tomando aspirina, ibuprofeno o corticoides.
- ✓ No utilice este medicamento si ha tomado otros antiinflamatorios no esteroides y ha sufrido efectos adversos.
- ✓ No utilice este medicamento si padece alguna enfermedad gastrointestinal.
- ✓ No utilice este medicamento si padece alteraciones hepáticas o renales graves.
- ✓ No utilice este medicamento si padece una insuficiencia cardíaca grave.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé.

Dosis y Administración:

- Se recomienda ingerir este medicamento con una cantidad suficiente de líquido y tómelo preferentemente con las comidas.
- No lo tome nunca con alcohol.
- Nunca tome una dosis doble de naproxeno para compensar la dosis olvidada.
- Si el dolor no cede por más de 10 días, consulte a su médico.
- Tenga en cuenta que el gel no se ingiere, es de aplicación local, así que debe friccionarse cuidadosamente con el mismo sobre la parte afectada.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Dígame a su médico y/o farmacéutico si Ud. es alérgico al naproxeno, a la aspirina o a otros medicamentos.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando, especialmente anticoagulantes, aspirina, ibuprofeno y esteroides orales como dexametasona, metilprednisolona y prednisona.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si Ud. toma alcohol.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si ha tenido o padece úlceras o hemorragias en el estómago o los intestinos o trastornos hemorrágicos de cualquier tipo.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando.
- ✓ Este medicamento puede llegar a producir somnolencia.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.



Ante una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar

