

ACIDO FOLICO

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El ácido fólico es un antianémico que está indicado en el tratamiento de la anemia megaloblástica por carencia de esta vitamina o de vitamina B12 o de ambas. Se prescribe en situaciones especiales como embarazo, lactancia y hemorragias crónicas. Se lo usa también para otras afecciones comúnmente asociadas con la deficiencia de ácido fólico, como colitis ulcerosa, patologías hepáticas, alcoholismo y diálisis renal.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar este medicamento en los casos de hipersensibilidad conocida al principio activo o a algún excipiente de la fórmula.
- ✓ Tomar este medicamento junto con los alimentos reduce en forma leve su absorción.
- ✓ La toma de antiácidos que contengan aluminio o magnesio pueden disminuir la absorción de este medicamento.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene gota.



Dosis y administración:

- La dosis habitual es: 1 a 15 mg/día.
- La dosis de mantenimiento se adaptará en forma individual según la disminución de los síntomas clínicos y la normalización de la fórmula sanguínea.
- Se aconseja que los pacientes sean controlados y la dosis debe adaptarse inmediatamente con el fin de evitar una recaída.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o a su farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos.
- ✓ Los pacientes que ingieran antiácidos deben hacerlo 2 horas después de haber tomado el ácido fólico.
- ✓ No debe administrarse sin descartar previamente el diagnóstico de anemia perniciosa.
- ✓ No administrarse en caso de anemia megaloblástica de origen incierto.
- ✓ Debe usarse con precaución en pacientes con tumores folatodependientes.
- ✓ Debe administrarse con precaución en aquellos pacientes que padecen gota, ya que pueden experimentar una crisis.
- ✓ Puede ser necesario un aumento de la dosis de mantenimiento en los casos de alcoholismo, anemia hemolítica o infección crónica.
- ✓ Se aconseja realizar un test de absorción de la cobalamina en los pacientes de edad avanzada antes de comenzar un tratamiento prolongado.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Siempre conserve los fármacos en lugar seco y al abrigo de la luz.

Ante una sobredosisificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA