

HIDROXIDO DE MAGNESIO

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de **VENTA LIBRE**

El hidróxido de magnesio es un laxante que se indica para el tratamiento sintomático y temporal del estreñimiento ocasional y también se usa como antiácido.
Se presenta en forma de solución.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al hidróxido de magnesio.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos.
- ✓ No utilice este medicamento si padece de deshidratación severa.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene úlcera péptica o insuficiencia hepática.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene hemorragia gastrointestinal o rectal.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene insuficiencia renal grave, inflamación y/u obstrucción intestinal.
- ✓ No utilice este medicamento en niños sin antes consultar con su pediatra.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada.
- ✓ No utilice este medicamento si está amamantando a su bebé.



Dosis y administración:

Las dosis recomendadas son:

Solución líquida:

• **Como laxante:**

Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 2 a 4 cucharadas en 1 o 2 dosis.
Niños de 6 a 11 años: 1 a 2 cucharadas seguidas de un vaso lleno de líquido.

Se aconseja no tomar este medicamento por más de una semana.

• **Como antiácido:**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 3 cucharadas con un poco de agua hasta 4 veces en un día o según indicación médica.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o al farmacéutico si Ud. es alérgico al hidróxido de magnesio o a otros medicamentos.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando.
- ✓ No tome este medicamento si tiene algún síntoma de apendicitis, obstrucción intestinal, hemorragia gastrointestinal o rectal no diagnosticada.
- ✓ Evite su uso si tiene colitis ulcerosa, colostomía, diverticulitis, ileostomía y/o diarrea crónica.
- ✓ Tenga en cuenta que está contraindicado el uso de hidróxido de magnesio si usted tiene insuficiencia renal grave y en la insuficiencia hepática.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada o si está amamantando.
- ✓ Tener en cuenta que los laxantes y los antiácidos no son recomendables para niños menores de 6 años.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga este medicamento en su envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento a temperatura ambiente y en un lugar seco.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- **Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777**
- **Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555**

www.cofa.org.ar



FARMACIA