

HIOSCINA

(Hioscina N-butil bromuro)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La hioscina N-butil bromuro es un antiespasmódico que se utiliza para el tratamiento de los espasmos del tracto gastrointestinal, de los espasmos y trastornos de la motilidad de las vías biliares y de los del tracto genitourinario. Se presenta en forma de perlas, cápsulas blandas y grageas.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos por día de los indicados.
- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico a la hioscina N-butil bromuro.
- ✓ No utilice este medicamento si padece glaucoma de ángulo estrecho y no está siendo tratado.
- ✓ No utilice este medicamento si padece hipertrofia de próstata.
- ✓ No utilice este medicamento si sufre de retención de orina por cualquier patología uretroprostática.
- ✓ No utilice este medicamento si padece de estrechamiento del tracto gastrointestinal o del píloro.
- ✓ No utilice este medicamento si padece de íleo paralítico.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene taquicardia.
- ✓ No utilice este medicamento si padece megacolon o miastenia gravis.
- ✓ No utilice este medicamento durante el primer y último trimestre de embarazo.
- ✓ No utilice este medicamento si está amamantando a su bebé.



Dosis y administración:

Las dosis recomendadas son:

Perlas cápsulas blandas o grageas

Adultos y niños mayores de 6 años: 1 a 2 cápsulas blandas o grageas cada 4 o 6 horas.

Ingiera las cápsulas o las grageas sin masticar con un vaso lleno de agua.

No se requiere ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal o hepática.

No está indicada en niños menores de 6 años.

Si no desaparecieron los síntomas, consulte a su médico.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, NO duplique la dosis.
- ✓ Se advierte que con la toma de este medicamento puede tener visión borrosa, somnolencia y/o sequedad bucal.
- ✓ Se aconseja no tomar este medicamento si tiene diarrea.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene insuficiencia renal y/o hepática severa.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ No ingiera medicamentos delante de los niños.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA