

CLONIXINATO DE LISINA

Ud. está llevando un MEDICAMENTO de VENTA BAJO RECETA

El clonixinato de lisina es un analgésico antiinflamatorio no esteroide con acción predominantemente analgésica, que está indicado en el tratamiento de procesos dolorosos leves a moderados, tales como cefalea, molestias osteoarticulares y síndromes reumatoides.

Se presenta en forma de: comprimidos y comprimidos recubiertos



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al clonixinato de lisina.
- ✓ No utilice este medicamento si ha tomado otros antiinflamatorios no esteroideos y ha tenido efectos adversos.
- ✓ No utilice este medicamento si padece ulcera péptica activa.
- ✓ No utilice este medicamento si padece hemorragia gastroduodenal.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene antecedentes de broncoespasmo.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene antecedentes de pólipos nasales.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ No utilice este medicamento en niños menores de 12 años.

Dosis y administración:

Comprimidos:

Adultos y niños mayores de 12 años:

1 comprimido de 125 mg 3 a 4 veces por día, a intervalos regulares y según la intensidad del dolor. Los comprimidos deben ingerirse enteros, sin partarlos ni masticarlos y con abundante líquido. La dosis máxima diaria es: 6 comprimidos.

Comprimidos recubiertos:

Adultos: 1 o 2 comprimidos recubiertos de 125 mg hasta cuatro veces por día, según la intensidad del dolor.

Los comprimidos recubiertos deben ingerirse enteros, sin partarlos ni masticarlos, acompañados de 1 o 2 sorbos de agua.

A tener en cuenta: Los comprimidos recubiertos contienen lactosa. Si bien la cantidad de lactosa presente en el medicamento probablemente es insuficiente para desencadenar síntomas de intolerancia, en caso de aparecer diarrea es conveniente consultar al médico.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si usted es alérgico al clonixinato de lisina, a la aspirina o a otros medicamentos.
- ✓ Se advierte que las personas con intolerancia a la lactosa no deben ingerir los comprimidos recubiertos.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando, especialmente anticoagulantes, antihipertensivos y diuréticos.
- ✓ Se advierte que ante la administración de altas dosis de clonixinato de lisina pueden presentarse vómitos, gastritis y somnolencia.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si ha tenido o padece de antecedentes de gastritis, úlceras o hemorragias en el estómago o los intestinos o trastornos hemorrágicos de cualquier tipo, ya que el clonixinato de lisina debe ser administrado con precaución y según indicación médica.
- ✓ Se aconseja administrar con precaución en los adultos mayores con alteraciones en su función hepática, renal y/o cardiovascular.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si usted está embarazada o amamantando.
- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el producto.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

CoFA
www.cofa.org.ar



TU FARMACIA