

DEXIBUPROFENO

Ud. está llevando un MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El dexibuprofeno es un analgésico, antiinflamatorio y antifebril que está indicado para el alivio temporario de dolores de cabeza, fiebre, resfrío y estados gripales, así como para los dolores de dientes y los dolores menstruales. También se lo usa para el tratamiento de los procesos inflamatorios y dolorosos de las articulaciones, los dolores de la artritis y la artrosis. Se presenta en forma de comprimidos recubiertos.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al dexibuprofeno.
- ✓ Si utiliza dexibuprofeno para bajar la fiebre, no lo tome por más de 3 días sin antes consultar a su médico.
- ✓ No tome dexibuprofeno por más de 10 días para aliviar el dolor sin antes consultar a su médico.
- ✓ No utilice este medicamento con otros productos que contengan dexibuprofeno.
- ✓ No utilice este medicamento si está tomando aspirina, paracetamol u otros analgésicos antiinflamatorios.
- ✓ No utilice este medicamento si ha tomado otros antiinflamatorios no esteroideos y ha tenido efectos adversos.
- ✓ No utilice este medicamento si padece úlcera gástrica o duodenal.
- ✓ No utilice este medicamento si padece alteraciones hepáticas o renales graves.
- ✓ No utilice este medicamento si es hipertenso o tiene una insuficiencia cardíaca.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ No utilice este medicamento en niños menores de 12 años.

Dosis y administración:

- **Adultos y niños mayores de 12 años:**
1 comprimido de dexibuprofeno cada 8 o 12 horas según corresponda.
No tome más de 3 comprimidos diarios de dexibuprofeno.
- **Tener en cuenta:**
Se recomienda ingerir este medicamento con una cantidad suficiente de líquido y preferentemente con las comidas o inmediatamente después de comer, para reducir la posibilidad de molestias gástricas.
No lo tome nunca con alcohol.
No tome nunca 2 comprimidos juntos para compensar la dosis olvidada.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si Ud. es alérgico al dexibuprofeno, a la aspirina o a otros medicamentos.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando, especialmente anticoagulantes, aspirina, ibuprofeno y esteroides orales.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si Ud. toma 3 o más vasos de alcohol diarios.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si ha tenido o padece de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades hepáticas o renales, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con:



- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

 **CoFA**
www.cofa.org.ar



TU FARMACIA